



*Lepidocybium flavobrunneum* (Smith 1843)

## RELACIÓN ENTRE LA TALLA Y EL PESO DEL NEGRITO

TALLA		PESO		TALLA		PESO	
FL(cm)	RW(kg)	DW(kg)	FL(cm)	RW(kg)	DW(kg)	FL(cm)	DW(kg)
20	0,1	0,1	115	18,9	14,6		
25	0,2	0,1	120	21,6	16,6		
30	0,3	0,2	125	24,5	18,9		
35	0,5	0,4	130	27,7	21,3		
40	0,8	0,6	135	31,1	23,9		
45	1,1	0,8	140	34,8	26,8		
50	1,5	1,1	145	38,9	29,9		
55	2,0	1,5	150	43,2	33,2		
60	2,6	2,0	155	47,8	36,8		
65	3,3	2,5	160	52,8	40,6		
70	4,1	3,2	165	58,1	44,7		
75	5,1	3,9	170	63,8	49,0		
80	6,2	4,8	175	69,8	53,7		
85	7,4	5,7	180	76,2	58,6		
90	8,9	6,8	185	83,0	63,9		
95	10,5	8,1	190	90,2	69,4		
100	12,3	9,5	195	97,8	75,3		
105	14,3	11,0	200	105,9	81,4		
110	16,5	12,7	205	114,4	88,0		

FL=longitud desde el morro a la horquilla de la aleta caudal.

RW (peso vivo), DW (peso canal)=RW/1,3

Peso= $a \cdot Talla^b$ ;  $a=0,0000053581$  y  $b=3,16326$  (Mejuto 1996)



Centro Costero Oceanográfico de A Coruña  
 Paseo Marítimo A. Francisco Vázquez, nº 10  
 15001 A Coruña (España)  
 Apartado 130, 15080 A Coruña (España)  
 e-mail: [tunidos.corunha@ieo.csic.es](mailto:tunidos.corunha@ieo.csic.es)  
 Tfno: 981 218151

